

Argusvlinder

Lasiommata megera

Informatie over de argusvlinder

- De argusvlinder is een dagvlinder die vaak twee en soms drie generaties per jaar heeft.
- De argusvlinder komt voor in bloemrijke, gevarieerde graslanden, bermen en dijken.
- De vlinders voeden zich met nectar van onder andere braam, rode klaver, akkerdistel en vlinderstruik.
- Rupsen van de argusvlinder eten vooral 's nachts en hebben diverse soorten gras als waardplant.
- Argusvlinders maken graag gebruik van zonnige, warme plekjes met weinig begroeiing.



Foto: Charles J. Sharp

Waarom heeft de argusvlinder hulp nodig?

De argusvlinder is sinds 1992 met 98% in aantal afgenomen in Nederland. De soort staat nog niet op de Rode Lijst, maar zou bij een herziening daar zeker op komen te staan als 'bedreigd'. Oorzaken zijn waarschijnlijk de afname van kruidenrijk grasland, de kwaliteit van het leefgebied, het verdwijnen van landschapselementen, en stikstofdepositie.

Hoe kunnen wij helpen?

- Maak je terrein insectvriendelijk door het aanbod van verschillende, inheemse, bloeiende planten te vergroten. Onder andere braam, rode klaver, havikskruid, leeuwentand, kattenstaart, knoopkruid en akkerdistel zijn geliefd bij argusvlinders.
- De vlinderstruik is een echte magneet voor vlinders, maar niet inheems en potentieel invasief. Een goed compromis is het aanplanten van een steriele kweekvariant die zich niet kan uitzaaien.
- Belangrijke grassoorten voor rupsen van de argusvlinder zijn onder andere schapengras, kropbaar, bochtige smele, rood zwenkgras en glanshaver. Argusvlindervrouwtjes selecteren graspollen op warme beschutte plaatsen.
- Variatie in begroeiing met verschillende hoogtes in de vegetaties en de aanwezigheid van warme, zonnige plekjes is van groot belang voor argusvlinders, vaak in de buurt van kale grond.
- Landschapselementen zoals heggen en houtwallen zijn ook van belang voor het creëren van zonnige, beschutte plekken. Bovendien gebruiken argusvlindermannetjes lijnelementen in het landschap tijdens hun patrouillevluchten.
- Te vaak en te kort maaien van graslanden en bermen waar argusvlinders voorkomen is funest voor de soort. Maai altijd gefaseerd zodat er minstens 30% blijft staan, zeker op dijken, langs hekken en op andere warme, beschutte plekjes. Gefaseerd maaien kan het beste eind mei, dan vliegen de argusvlinders, en zijn er (even) geen rupsen. Voer het maaisel af, om verrijking van de bodem en verruiging van de vegetatie tegen te gaan.

Monitoring

- Voer je waarnemingen van de argusvlinder in op [waarneming.nl](https://www.waarneming.nl).
- Loop in het voorjaar en zomer met regelmaat een vaste telroute waarbij je alle vlinders noteert die je ziet. Of doe af en toe een flextelling.

Meer informatie

[Beheeradvies argusvlinder](#)

[Beschermingsplan argusvlinder – Vlinderstichting](#)

Bronnen

<https://www.reddeargusvlinder.nl>

<https://www.vlinderstichting.nl/>

Wist je dat ...

De naam argusvlinder is afgeleid van de Griekse mythe over de reus argus die wel honderd ogen had. De argusvlinder zelf heeft aan de boven- en onderzijde van zijn vleugels ook meerder 'ogen'.

