

Hermelijn

Mustela erminea

Alles over de hermelijn

- De hermelijn is een kleine marterachtige, en dus familie van onder andere das, bunzing en wezel. Ze zijn inclusief staart zo'n 35 cm lang en wegen 150 tot 400 gram. De hermelijn lijkt op de wezel, maar is een slagje groter en heeft ook een beduidend langere staart. Een hermelijn heeft een witte wintervacht en een bruine zomervacht. Dat maakt hem/haar perfect gecamoufleerd in de verschillende seizoenen.
- De hermelijn komt in allerlei verschillende landschapstypen voor, als er maar voldoende voedsel en dekking te vinden is. Ze hebben een voorkeur voor een gevarieerd kleinschalig landschap waar genoeg beschutting te vinden is.
- Hermelijnen zijn fanatieke jagers. Muizen, ratten, konijnen zijn het belangrijkste voedsel. Ook eten ze soms vogels en vogeleeieren.
- Een hermelijn heeft zijn of haar verblijfplaats in een hol, vaak konijnenhol of een oude mollengang.



Hermelijn, foto: Marton Berntsen

Waarom heeft de hermelijn hulp nodig?

De hermelijn is sterk in aantal achteruitgegaan door intensieve landbouw, verlies en versnippering van leefgebied, verkeer en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De soort staat op de Rode Lijst als kwetsbaar.

Hoe kunnen wij helpen?

- Het is belangrijk om weer meer kleinschalig agrarisch landschap te creëren waar natuurinclusief geboerd wordt. Meer variatie in begroeiing, meer ruigte en minder intensief beheer zijn hierbij de sleutel.
- Zorg voor schuilplekken. Dat kan middels rommelhoekjes, takkenbossen, en steenhopen. Een takkenril of hooiruiters bieden daarnaast ook ruimte voor prooidieren van hermelijnen. Zie voor aanleginstructies het [Infoblad aanleg takkenril en hooiruiters](#) van SLG.
- Plant bes- en nootdragende struiken – zoals hazelaar, meidoorn, lijsterbes – als voedsel voor prooidieren om het leefgebied van hermelijnen te bevorderen.
- Hermelijnen maken graag gebruik van structuurelementen als heggen, houtwallen en slootkanten om zich beschut en veilig te verplaatsen.
- Beperk werkzaamheden bij mogelijke verblijfplaatsen. Vooral het voorjaar en de eerste helft van de zomer zijn kwetsbare periodes vanwege de voortplanting.
- [Houd katten 's nachts binnen](#). Hermelijnen worden soms gedood door huiskatten. Bovendien doden huiskatten jaarlijks grote aantallen muizen, spitsmuizen en jonge konijnen, waardoor er voor hermelijnen vaak niet genoeg voedsel meer is.

Monitoring

- Noteer je waarnemingen en voer je resultaten in op [waarneming.nl](#).
- Hermelijnen zijn nachtactief en laten zich niet gemakkelijk zien. Een cameraval op een geschikte plek is een leuke manier om ze toch in beeld te brengen.

Meer informatie

[Beheerwijzer kleine marterachtigen – Zodion](#)
www.marterstichting.nl

Bronnen

[Zoogdivereniging](#)
[Stichting Landschapsbeheer Gelderland](#)

Wist je dat ...

De hermelijn elke dag ongeveer 25% van zijn eigen lichaamsgewicht eet!