

Kleine zoogdieren

Alles over kleine zoogdieren

- Onder de kleine zoogdieren horen soorten als egel, konijn, eekhoorn, marterachtigen zoals hermelijn, wezel en bunzing, en verschillende soorten spitsmuizen, woelmuizen (o.a. veldmuis), en 'ware' muizen (o.a. bosmuis en dwergmuis).
- Deze soorten zijn afhankelijk van een gevarieerd kleinschalig landschap waar genoeg beschutting te vinden is. Sommige soorten zijn volledig herbivoor, zoals het konijn; soorten als hermelijn en wezel zijn echte roofdieren; terwijl bosmuis en eekhoorn zich op meerdere voedselbronnen richten.
- Kleine zoogdieren gebruiken uiteenlopende verblijfplaatsen. Konijnen, veld- en bosmuizen maken gebruik van hollen. Eekhoorns bouwen nest – zogenaamde kobels – hoog in bomen. Kleine marterachtigen gebruiken bestaande hollen, holle boomstammen of houtstapel als schuil- en rustplaats. Spitsmuizen leven over het algemeen verscholen onder ruige vegetatie.



Rode eekhoorn, foto: Peter Trimming

Waarom hebben kleine zoogdieren hulp nodig?

Veel kleine zoogdieren zijn sterk in aantal achteruitgegaan of staan onder druk door intensieve landbouw, verlies en versnippering van leefgebied, verkeer en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Hoe kunnen wij helpen?

- Het is belangrijk om weer meer kleinschalig agrarisch landschap te creëren waar natuurinclusief geboerd wordt. Meer variatie in begroeiing, meer ruigte en minder intensief beheer zijn hierbij de sleutel. Vermijd het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (zoals slakkenkorrels). Voor alle soorten kleine zoogdieren geldt dat zij voldoende voedsel, verblijfplaats, veiligheid en verbinding tussen leefgebieden nodig hebben.
- Zorg voor schuilplekken. Veel kleine zoogdieren maken graag gebruik van hopen takken, blad of compost. Ook grotere structuurelementen als heggen, houtwallen en takkenrillen bieden dekking en veilige routes.
- Beperk werkzaamheden bij mogelijke verblijfplaatsen. Controleer voor het maaien, snoeien of opruimen of er dieren aanwezig zijn. Vooral het voorjaar en de eerste helft van de zomer zijn kwetsbare periodes vanwege de voortplanting. Voor egels en eekhoorns is ook de winter een belangrijke rustperiode.
- Leg een [wintervoedselveldje](#) of [meerjarige akkerranden](#) aan. Deze bieden voedsel en dekking aan veel kleine zoogdieren. Muizen die hier op afkomen zijn weer een voedselbron voor roofvogels en marterachtigen.
- Maak tuinen diervriendelijk door een deel wat ruiger te laten worden, inheemse struiken te planten, en voor doorgangen te zorgen in schuttingen en hekken.
- Dek regenputten of diepe waterbakken af of plaats een eenvoudige uitklimmogelijkheid, zodat dieren er niet in kunnen verdinken.
- Steun een lokale regeneratieve of natuurinclusieve boer of een lokaal voedselbos.
- Houd katten 's nachts binnen. Huiskatten doden jaarlijks grote aantallen muizen, spitsmuizen, jonge konijnen, en ook veel vogels.

Monitoring

- Noteer je waarnemingen en voer je resultaten in op [waarneming.nl](#).
- Veel zoogdieren zijn nachttactief en laten zich niet gemakkelijk zien. Een cameraval op een geschikte plek is een leuke manier om zoogdieren op je terrein in kaart te brengen.



Kleine zoogdieren

Meer informatie

[Soortenzoeker muizen](#)

[Infoblad Eekhoorn – Groene Huis Amersfoort](#)

[Infoblad Egel – Groene Huis Amersfoort](#)

[Infoblad Bunzing – Groene Huis Amersfoort](#)

[Beheerwijzer kleine marterachtigen – Zodion](#)

www.marterstichting.nl


Bronnen

www.zoogdiervereniging.nl

Wist je dat ...

Een hermelijn in de zomer
een bruine vacht heeft en in
de winter een witte vacht.

Dat maakt hem/haar
perfect gecamoufleerd
in de verschillende
seizoenen.



Hermelijn met zomervacht (boven)
en met wintervacht (onder)

